

| 医薬品名 | 採用区分 | 厚労省コード |
|--------------------------------------|---------|--------------|
| セボフレン吸入麻酔液 | 院内のみ採用 | 1119702G1062 |
| エスクレ坐剤「250」 | 院内・院外採用 | 1123700J1020 |
| ダイアアップ坐剤4 | 院内・院外採用 | 1124701J1022 |
| ダイアアップ坐剤6 | 院内・院外採用 | 1124701J2029 |
| ワコビタール坐剤15 | 院内・院外採用 | 1125700J1025 |
| ワコビタール坐剤30 | 院内・院外採用 | 1125700J3028 |
| アンヒバ坐薬小児用100mg | 院内・院外採用 | 1141700J2130 |
| アンヒバ坐薬小児用200mg | 院内・院外採用 | 1141700J3110 |
| ボルタレンサポ12.5mg | 院内・院外採用 | 1147700J1057 |
| ボルタレンサポ25mg | 院内・院外採用 | 1147700J2061 |
| ボルタレンサポ50mg | 院内・院外採用 | 1147700J3084 |
| キシロカインビスカス2% | 院内のみ採用 | 1214001S1054 |
| キシロカインゼリー2%(30ml/本) | 院内・院外採用 | 1214700P1054 |
| キシロカイン液「4%」 | 院内・院外採用 | 1214700Q1033 |
| キシロカイン点眼液4%(20ml/本) | 院内のみ採用 | 1214700Q1041 |
| キシロカインポンプスプレー8%(80g/本) | 院内・院外採用 | 1214701R1050 |
| ペンレステープ18mg | 院内のみ採用 | 1214701S1051 |
| サイプレジン1%点眼液(10ml/本) | 院内・院外採用 | 1311701Q1031 |
| ネオシネジンコーワ5%点眼液(10ml/本) | 院内・院外採用 | 1311702Q1036 |
| ミドリンM点眼液0.4%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 1311705Q1048 |
| 目点アトロピン点眼液1%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 1311706Q2022 |
| サンピロ点眼液2%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 1312701Q3082 |
| ベノキシール点眼液0.4%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 1313700Q2070 |
| オドメール点眼液0.02%(5ml/本)(フルトロン) | 院内・院外採用 | 1315704Q1123 |
| オドメール点眼液0.1%(5ml/本)(フルトロン) | 院内・院外採用 | 1315704Q3134 |
| ブレドニン眼軟膏(5g/本) | 院内・院外採用 | 1315705M1037 |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 院内・院外採用 | 1315706Q2102 |
| ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」(5g/個) | 院内・院外採用 | 1317712M1031 |
| チモプトールXE点眼液0.5%(2.5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319702Q4033 |
| リズモンTG点眼液0.5%(2.5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319702Q6028 |
| カリーユニ点眼液0.005% | 院内・院外採用 | 1319706Q3035 |
| タチオン点眼用2%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319708Q1090 |
| サンコバ点眼液0.02%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319710Q2078 |
| PA・ヨード点眼・洗眼液 | 院内のみ採用 | 1319715Q1031 |
| ゾビラックス眼軟膏3%(5g/本) | 院内・院外採用 | 1319719M1046 |
| ヒアレイン点眼液0.1%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319720Q3078 |
| ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4ml/個) | 院内・院外採用 | 1319720Q5038 |
| ヒーロン0.6眼粘弾剤1% | 院内のみ採用 | 1319720Q7146 |
| オペリード1.1眼粘弾剤1% | 院内のみ採用 | 1319720Q9050 |
| ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3% | 院内のみ採用 | 1319720Y1032 |
| タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本) | 院内・院外採用 | 1319722M1056 |
| ニフラン点眼液0.1%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319724Q1120 |
| ジクロード点眼液0.1%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319726Q1102 |
| オベガードネオキット眼灌流液0.0184%(500mL/袋) | 院内のみ採用 | 1319731Q4030 |
| レスキュラ点眼液0.12%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319732Q1035 |
| リザベン点眼液0.5%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319736Q1076 |
| アイオピジンUD点眼液1% | 院内のみ採用 | 1319737Q1038 |
| キサラタン点眼液0.005%(2.5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319739Q1037 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」(5ml/本)(クレビット) | 院内・院外採用 | 1319742Q1250 |
| プロナック点眼液0.1%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319743Q1033 |
| エイゾプト懸濁性点眼液1%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319748Q1036 |
| ガチフロ点眼液0.3%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319749Q1030 |
| パタノール点眼液0.1%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319752Q1024 |
| ペガモックス点眼液0.5% | 院内・院外採用 | 1319753Q1029 |
| トラバタンズ点眼液0.004%(2.5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319754Q1023 |
| タリムス点眼液0.1%(5ml/瓶) | 院内・院外採用 | 1319755Q1028 |
| ジクアス点眼液3%(5mL/本) | 院内・院外採用 | 1319758Q1021 |
| ネバナック懸濁性点眼液0.1%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319759Q1026 |

| | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|
| エコリシン眼軟膏 (3.5g/個) | 院内・院外採用 | 1319800M1023 |
| コリナコール点眼液(5mL/本) | 院内・院外採用 | 1319802Q2039 |
| 人工涙液マイティア点眼液 (5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319808Q2036 |
| ミドリンP点眼液 (10ml/本) | 院内・院外採用 | 1319810Q1053 |
| ビスコート0.5眼粘弾剤 | 院内のみ採用 | 1319816Q1034 |
| デュオトラバ配合点眼液 (2.5ml/本) | 院内・院外採用 | 1319820Q1022 |
| ミケルナ配合点眼液 | 院内・院外採用 | 1319823Q1026 |
| プリビナ液0.05% | 院内・院外採用 | 1324704Q1033 |
| ベストロン耳鼻科用1% | 院内・院外採用 | 1325702Q1040 |
| ザジテン点鼻液0.05% (8ml/本) | 院内・院外採用 | 1329705Q1298 |
| タリビッド耳科用液0.3%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 1329706Q1039 |
| ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用(5mg/瓶) | 院内・院外採用 | 1329710Q1027 |
| アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用 | 院内・院外採用 | 1329711Q1021 |
| ビソノテープ4mg | 院内のみ採用 | 2149700S1027 |
| ビソノテープ4mg | 院内・院外採用 | 2149700S1027 |
| ブランドルテープ40mg | 院内・院外採用 | 2171700S1095 |
| ミオコールスプレー0.3mg | 院内・院外採用 | 2171701R4038 |
| サーファクテン気管注入用120mg | 院内のみ採用 | 2219700G1039 |
| プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ」(ヒソルボン) | 院内・院外採用 | 2234700G1043 |
| インタール吸入液1% (2ml/本) | 院内・院外採用 | 2259701G1063 |
| メプチン吸入液0.01% (30ml/本) | 院内・院外採用 | 2259704G1032 |
| メプチン吸入液ユニット0.3mL(0.3mL/本) | 院内・院外採用 | 2259704G5020 |
| メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回 (1mg/キット) | 院内・院外採用 | 2259704Y1020 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」(ホクナリン) | 院内・院外採用 | 2259707S1055 |
| テストロールテープ0.5mg「HMT」(ホクナリン) | 院内のみ採用 | 2259707S1055 |
| ツロブテロールテープ 1mg「HMT」(ホクナリン) | 院内・院外採用 | 2259707S2051 |
| ツロブテロールテープ 2mg「HMT」(ホクナリン) | 院内・院外採用 | 2259707S3058 |
| セレベント50ディスカス(60プリスタ/ディスカス) | 院内・院外採用 | 2259708G3025 |
| スピリーバ吸入用カプセル18 μ g | 院内・院外採用 | 2259709G1027 |
| スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入 | 院内・院外採用 | 2259709G2023 |
| シーブリ吸入用カプセル50 μ g | 院内・院外採用 | 2259712G1029 |
| アノーロエリプタ30吸入用(30吸入/1キット) | 院内・院外採用 | 2259806G2028 |
| アズノールうがい液4%(5ml/本) | 院内・院外採用 | 2260700F1021 |
| ホピドンヨトガーグル7%「日医工」(30ml/本)(イソジン) | 院内・院外採用 | 2260701F1352 |
| フルタイド100ディスカス(60プリスタ/ディスカス) | 院内・院外採用 | 2290700G5021 |
| フルタイド200ディスカス(60プリスタ/ディスカス) | 院内・院外採用 | 2290700G6028 |
| フルタイド50 μ gエアゾール120 | 院内・院外採用 | 2290700G7032 |
| パルミコート吸入液0.25mg | 院内・院外採用 | 2290701G4020 |
| パルミコート吸入液0.5mg | 院内・院外採用 | 2290701G5026 |
| オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 | 院内・院外採用 | 2290702G3028 |
| アドエア100ディスカス28吸入用 | 院内・院外採用 | 2290800G1032 |
| シムビコートタービューヘイラー60吸入 | 院内・院外採用 | 2290801G2025 |
| レルベア100エリプタ30吸入用 (30吸入/1キット) | 院内・院外採用 | 2290803G3020 |
| レルベア200エリプタ30吸入用 (30吸入/1キット) | 院内・院外採用 | 2290803G4027 |
| ラニチジン注50mg「タイヨ」(2mL/A) | 院内・院外採用 | 2325402A1041 |
| グリセリン | 院内・院外採用 | 2357700X1078 |
| グリセリン | 院内のみ採用 | 2357700X1078 |
| ケンエーG浣腸液50% 40ml | 院内・院外採用 | 2357701K4104 |
| ケンエーG浣腸液50% 60ml | 院内・院外採用 | 2357701K6212 |
| ケンエーG浣腸液50% 120ml | 院内・院外採用 | 2357701K8177 |
| 新レシカルボン坐剤 | 院内・院外採用 | 2359800J1035 |
| 複方ヨード・グリセリン | 院内・院外採用 | 2399700X1060 |
| アクロマイシントローチ15mg | 院内・院外採用 | 2399702E1033 |
| デキサルチン口腔用軟膏1mg/g(2g/本) | 院内・院外採用 | 2399706M1109 |
| アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g | 院内・院外採用 | 2399707D1030 |
| オラドールトローチ0.5mg | 院内・院外採用 | 2399712E1053 |
| ナウゼリン坐剤10 | 院内・院外採用 | 2399714J1026 |
| ナウゼリン坐剤30 | 院内・院外採用 | 2399714J2022 |
| ナウゼリン坐剤60 | 院内・院外採用 | 2399714J3029 |

| | | |
|--------------------------------------|---------|--------------|
| ペンタサ坐剤1g | 院内・院外採用 | 2399715J1020 |
| ペンタサ注腸1g(100ml/本) | 院内・院外採用 | 2399715X1023 |
| レクタブル2mg注腸フォーム14回 | 院内・院外採用 | 2399716K1020 |
| ジェトロピンゴークイック注用12mg | 院内のみ採用 | 2412402P5020 |
| フォルテオ皮下注キット600 μ g | 院内・院外採用 | 2439400G1020 |
| エピペン注射液0.3mg | 院内・院外採用 | 2451402G3026 |
| ボスミン外用液0.1%(100ml/本) | 院内・院外採用 | 2451700Q1032 |
| リンデロン坐剤1.0mg | 院内・院外採用 | 2454700J2024 |
| ヒューマリンR注100単位/mL | 院内・院外採用 | 2492403A4051 |
| ノボリンN注フレックスペン(300単位/筒) | 院内・院外採用 | 2492413G1059 |
| ノボリンR注フレックスペン(300単位/筒) | 院内・院外採用 | 2492413G8053 |
| ノボラピッド注ペンフィル(300単位/筒) | 院内・院外採用 | 2492415A2035 |
| ノボラピッド30ミックス注フレックスペン300単位/筒 | 院内・院外採用 | 2492415G2020 |
| ノボラピッド注フレックスタッチ(300単位/キット) | 院内・院外採用 | 2492415G6025 |
| ランタス注ソロスター(300単位/筒) | 院内・院外採用 | 2492416G2024 |
| レベミル注フレックスペン(300単位/筒) | 院内・院外採用 | 2492417G1030 |
| アピドラ注ソロスター(300単位/筒) | 院内・院外採用 | 2492418G1027 |
| トリーバ注フレックスタッチ(300単位/キット) | 院内・院外採用 | 2492419G1021 |
| ライゾデグ配合注フレックスタッチ(300単位/キット) | 院内・院外採用 | 2492500G1025 |
| ビクトーザ皮下注18mg | 院内・院外採用 | 2499410G1021 |
| リキスミア皮下注300 μ g(300 μ g/キット) | 院内・院外採用 | 2499415G1024 |
| トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | 院内・院外採用 | 2499416G1029 |
| プレグランディン膣坐剤 | 院内・院外採用 | 2499700H1036 |
| ウロマチックS泌尿器科用灌流液(3L/袋) | 院内のみ採用 | 2519700Q1030 |
| クロマイ膣錠100mg | 院内・院外採用 | 2521701H1050 |
| ホーリンV膣用錠1mg | 院内・院外採用 | 2529701H2046 |
| フラジール膣錠250mg | 院内・院外採用 | 2529707H1063 |
| フラジール膣錠250mg | 院内のみ採用 | 2529707H1063 |
| オキナゾール膣錠100mg | 院内・院外採用 | 2529709H1046 |
| オキナゾール膣錠600mg | 院内・院外採用 | 2529709H2042 |
| ミレーナ52mg | 院内のみ採用 | 254970AX1020 |
| 強力ポステリザン(軟膏)(2g/本) | 院内・院外採用 | 2559808M1020 |
| ネリプロクト坐剤 | 院内・院外採用 | 2559814J1020 |
| ネリプロクト軟膏(2g/本) | 院内・院外採用 | 2559814M1026 |
| イソジンゲル10%(4g/本) | 院内・院外採用 | 2612701Q2109 |
| イソジンゲル10%(90g/本) | 院内・院外採用 | 2612701Q2109 |
| ホピドンヨード外用液10%「マイラン」(250ml/本)(イソジン) | 院内・院外採用 | 2612701Q3458 |
| プレポダインスクラブ0.75% | 院内のみ採用 | 2612706Q1032 |
| オキシドール | 院内・院外採用 | 2614700X1077 |
| 消毒用エタノール | 院内・院外採用 | 2615703X1450 |
| 無水エタノール | 院内・院外採用 | 2615704X1234 |
| 塩化ベンザルコニウム液10% | 院内・院外採用 | 2616700Q1093 |
| クレゾール石ケン液 | 院内のみ採用 | 2616703Q1321 |
| アクリノール液0.1% | 院内・院外採用 | 2619700Q1257 |
| マスキンWエタノール液0.5W/V%(500ml/本) | 院内・院外採用 | 2619702Q1060 |
| マスキンRエタノール液0.5W/V%(500ml/本) | 院内・院外採用 | 2619702Q2040 |
| 5%マスキン液 | 院内・院外採用 | 2619702Q3160 |
| ステリクロンW液0.02/500ml | 院内・院外採用 | 2619702Q8021 |
| ステリクロンW液0.05(500ml/本) | 院内・院外採用 | 2619702X2028 |
| ハイジール消毒用液10% | 院内のみ採用 | 2619716Q1177 |
| オラネジン液1.5%消毒用アプリケーションタ25mL | 院内のみ採用 | 2619717Q3026 |
| ハイポアルコール液2%「ヤクバン」 | 院内のみ採用 | 2619819X1092 |
| テラジアパスタ5% | 院内・院外採用 | 2633701M1054 |
| ゲーベンクリーム1%(50g/本) | 院内・院外採用 | 2633705N1031 |
| ゲンタシン軟膏0.1%(10g/本) | 院内・院外採用 | 2634710M1077 |
| ソフラチュール貼付剤10mg | 院内・院外採用 | 2634711S1046 |
| アクアチムクリーム1%(10g/本) | 院内・院外採用 | 2639700N1032 |
| ベナパスタ軟膏4% | 院内・院外採用 | 2642703M1036 |
| ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g/本) | 院内・院外採用 | 2646700N1169 |

| | | |
|--------------------------------------|---------|--------------|
| リンデロンV軟膏0.12% (5g/本) | 院内・院外採用 | 2646701M2156 |
| リンデロンVクリーム0.12% (5g/本) | 院内・院外採用 | 2646701N2135 |
| ドレニゾンテープ4 μ g/cm ² | 院内・院外採用 | 2646711S2051 |
| デルモベート軟膏0.05% (5g/本) | 院内・院外採用 | 2646713M1136 |
| ロコイド軟膏0.1% (5g/本) | 院内・院外採用 | 2646717M1096 |
| ロコイドクリーム0.1% (5g/本) | 院内・院外採用 | 2646717N1083 |
| キンダベート軟膏0.05% (5g/本) | 院内・院外採用 | 2646722M1100 |
| パルデスローション0.05%(10mL/本) | 院内・院外採用 | 2646722Q1048 |
| ボアラ軟膏0.12% (5g/本) | 院内・院外採用 | 2646724M1045 |
| ボアラクリーム0.12% (5g/本) | 院内・院外採用 | 2646724N1040 |
| マイザー軟膏0.05% (5g/本) | 院内・院外採用 | 2646725M1201 |
| マイザークリーム0.05% (5g/本) | 院内・院外採用 | 2646725N1150 |
| アルメタ軟膏 (5g/本) | 院内・院外採用 | 2646727M1022 |
| アンテベート軟膏0.05% (5g/本) | 院内・院外採用 | 2646730M1059 |
| アンテベートクリーム0.05% (5g/本) | 院内・院外採用 | 2646730N1054 |
| フルメタ軟膏 (5g/本) | 院内・院外採用 | 2646731M1029 |
| フルメタローション (10g/本) | 院内・院外採用 | 2646731Q1020 |
| テラ・コートリル軟膏 (5g/本) | 院内・院外採用 | 2647705M1023 |
| リンデロンVG軟膏0.12% (5g/本) | 院内・院外採用 | 2647709M1102 |
| リンデロンVGクリーム0.12% (5g/本) | 院内・院外採用 | 2647709N1060 |
| リンデロンVGローション (10ml/本) | 院内・院外採用 | 2647709Q1040 |
| 硫酸アルミニウムカリウム | 院内・院外採用 | 2649703X1017 |
| 亜鉛華軟膏 | 院内・院外採用 | 2649704M1171 |
| 亜鉛華軟膏 | 院内のみ採用 | 2649704M1171 |
| 亜鉛華デンプン | 院内のみ採用 | 2649705X1040 |
| 酸化亜鉛 | 院内・院外採用 | 2649708X1249 |
| アズノール軟膏0.033%(20g/本) | 院内・院外採用 | 2649716M1042 |
| インテバンクリーム (25g/本) | 院内・院外採用 | 2649719N1106 |
| インテバン外用液 (50ml/本) | 院内・院外採用 | 2649719Q2087 |
| オイラックスクリーム10%(10g/本) | 院内・院外採用 | 2649722N1027 |
| ザーネ軟膏0.5% | 院内・院外採用 | 2649724M1039 |
| モーラスパップXR240mg | 院内・院外採用 | 2649729S6024 |
| フェルピナクハップ70mg「ユートク」(7枚/袋)(セルタッチ) | 院内・院外採用 | 2649731S1291 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」(7枚/袋)(ロキソニン) | 院内・院外採用 | 2649735S2202 |
| オイラックスHクリーム (5g/本) | 院内・院外採用 | 2649800N1029 |
| フェノール・亜鉛華リニメント〈ハチ〉 | 院内・院外採用 | 2649804X1109 |
| MS温シップ「タイホウ」(5枚/袋) | 院内・院外採用 | 2649843S1039 |
| エキザルベ (5g/本) | 院内・院外採用 | 2649852M1020 |
| MS冷シップ「タカミツ」(5枚/袋) | 院内・院外採用 | 2649895S1044 |
| サリチル酸 | 院内・院外採用 | 2652700X1043 |
| 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 院内・院外採用 | 2652701M1025 |
| オキナゾールクリーム1%(10g/本) | 院内・院外採用 | 2655706N1041 |
| ニゾラルクリーム2% (10g/本) | 院内・院外採用 | 2655709N1053 |
| アトラント軟膏1% (10g/本) | 院内・院外採用 | 2655711M1039 |
| アトラント外用液1% (10ml/本) | 院内・院外採用 | 2655711Q1030 |
| ラミシールクリーム1% (10g/本) | 院内・院外採用 | 2659710N1152 |
| 酢酸 | 院内・院外採用 | 2661700X1050 |
| スピール膏M | 院内・院外採用 | 2661701X1020 |
| カリ石ケン | 院内のみ採用 | 2662700X1104 |
| 硝酸銀 | 院内・院外採用 | 2663700X1039 |
| イオウ・カンフルローション「東豊」 | 院内・院外採用 | 2669700X1040 |
| ウレパールクリーム10% (20g/本) | 院内・院外採用 | 2669701N1044 |
| ボンアルファ軟膏2 μ g/g(10g/本) | 院内・院外採用 | 2691700M1053 |
| オキサロール軟膏25 μ g/g (10g/本) | 院内・院外採用 | 2691702M1036 |
| アクトシン軟膏3% (30g/本) | 院内・院外採用 | 2699703M1039 |
| プロスタンディン軟膏0.003%(10g/本) | 院内・院外採用 | 2699705M1038 |
| プロトピック軟膏0.1%(5g/本) | 院内・院外採用 | 2699709M1028 |
| フィブラストスプレー500 | 院内・院外採用 | 2699710R2024 |
| ディフェリンゲル0.1% (15g/個) | 院内・院外採用 | 2699711Q1027 |

| | | |
|----------------------------------|---------|--------------|
| ロゼックスゲル0.75%(50g/本) | 院内・院外採用 | 2699713Q1026 |
| イソジンシュガーパスタ軟膏(100g/個) | 院内・院外採用 | 2699801V1114 |
| ネオステリングリーンうがい液0.2%(40ml/本) | 院内・院外採用 | 2790820Q1040 |
| 大塚糖液5%(5%ブドウ糖)20mL | 院内・院外採用 | 3231401A1094 |
| テルフィス点滴静注500ml | 院内・院外採用 | 3253404A4060 |
| エルネオパNF1号輸液 1000mL | 院内・院外採用 | 3259533G1029 |
| エルネオパNF1号輸液 1500mL | 院内・院外採用 | 3259533G2025 |
| エルネオパNF1号輸液 2000mL | 院内・院外採用 | 3259533G3021 |
| エルネオパNF2号輸液 1000mL | 院内・院外採用 | 3259534G1023 |
| エルネオパNF2号輸液 1500mL | 院内・院外採用 | 3259534G2020 |
| エルネオパNF2号輸液 2000mL | 院内・院外採用 | 3259534G3026 |
| 生食注シリンジ「テルモ」10mL/筒 | 院内・院外採用 | 3311402G7084 |
| トロンビン液モチダソフトボトル1万 | 院内のみ採用 | 3323702Q3020 |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本) | 院内・院外採用 | 3339950M1137 |
| ヒルドイドクリーム0.3%(25g/本) | 院内・院外採用 | 3339950N1035 |
| ハパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(ヒソフテン) | 院内・院外採用 | 3339950R1126 |
| アルスロマチック関節手術用灌流液(3L/袋) | 院内のみ採用 | 3399800Q1033 |
| エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL | 院内・院外採用 | 3999424G1025 |
| エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL | 院内・院外採用 | 3999424G2021 |
| ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4ml | 院内・院外採用 | 3999426G3027 |
| オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL(1本/1筒) | 院内・院外採用 | 3999429G1028 |
| シムジア皮下注200mgシリンジ | 院内・院外採用 | 3999437G1022 |
| バクトロバン鼻腔用軟膏2% | 院内・院外採用 | 6119700M1035 |
| アラセナ-A軟膏3%(5g/本) | 院内・院外採用 | 6250700M1189 |
| リレンザ(4ブリスト/ディスク) | 院内・院外採用 | 6250702G1028 |
| イナビル吸入粉末剤20mg | 院内・院外採用 | 6250703G1022 |
| クレナフィン爪外用液10%(3.56g/本) | 院内・院外採用 | 6290702Q1029 |
| アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター(1本/1キット) | 院内・院外採用 | 6399421G2029 |
| タルク | 院内・院外採用 | 7113700X1067 |
| 親水ワセリン「丸石」 | 院内・院外採用 | 7121702X1033 |
| 親水ワセリン | 院内のみ採用 | 7121702X1033 |
| 白色ワセリン | 院内・院外採用 | 7121703X1216 |
| プロペト | 院内・院外採用 | 7121703X1330 |
| オリーブ油 | 院内・院外採用 | 7121704X1091 |
| オリーブ油(滅菌済) | 院内・院外採用 | 7121704X1091 |
| プラスチックベース | 院内・院外採用 | 7129801X1027 |
| 滅菌精製水 | 院内・院外採用 | 7131700X1049 |
| 滅菌精製水 | 院内のみ採用 | 7131700X1049 |
| 石油ベンジン | 院内・院外採用 | 7139703X1024 |
| ハッカ水 | 院内・院外採用 | 7149005X1049 |
| ハッカ油 | 院内・院外採用 | 7149006X1060 |
| ホスコS-55 | 院内のみ採用 | 7190700X1040 |
| ボルヒール組織接着用 2mL4瓶1組 | 院内のみ採用 | 7990710X3031 |
| タコシール組織接着用シート(9.5cm×4.8cm) | 院内のみ採用 | 7990713X3027 |
| 麻)アンペック坐剤10mg | 院内・院外採用 | 8114700J1023 |
| 麻)アンペック坐剤20mg | 院内・院外採用 | 8114700J2020 |
| 麻)デュロテップMTパッチ2.1mg | 院内・院外採用 | 8219700S5026 |
| 麻)フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 | 院内・院外採用 | 8219700S5034 |
| 麻)デュロテップMTパッチ4.2mg | 院内・院外採用 | 8219700S6022 |
| 麻)フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 | 院内・院外採用 | 8219700S6030 |
| 麻)デュロテップMTパッチ8.4mg | 院内・院外採用 | 8219700S7029 |
| 麻)フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」 | 院内・院外採用 | 8219700S7037 |
| 麻)デュロテップMTパッチ16.8mg | 院内・院外採用 | 8219700S9021 |
| 麻)フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」 | 院内・院外採用 | 8219700S9030 |
| 塩化ナトリウム(外用) | 院内・院外採用 | |
| ヨードホルムガーゼ タマガワ | 院内・院外採用 | |
| BDマイクロファイナプラス(32G)4mm(14本/袋) | 院内・院外採用 | |
| ナノパスニードルⅡ(34G) | 院内・院外採用 | |
| ペンニードルプラス4mm(14本/袋) | 院内・院外採用 | |