

レジメン名	抗がん剤 (商品名)	投与量	投与時間	投与日	1コースの日数
CET(400/250)	アービタックス	初回：400mg/m ²	2時間	day1, 8	7日
		2回目以降：250mg/m ²	1時間		
CET(500)	アービタックス	500mg/m ²	2時間 (2回目以降は1時間)	day1	14日
PANI	ペクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	14日
IRI	カンプト	100mg/m ²	1時間	day1, 8, 15	28日
Nivo(240)	オブジーボ	240mg/body	30分	day1	14日
Nivo(480)	オブジーボ	480mg/body	30分	day1	28日
Ipi+Nivo	ヤーボイ	1mg/kg	30分	day1	21日
	オブジーボ	240mg/body	30分	day1	
PER+HER	パージェタ	初回：840mg/body	1時間	day1	21日
		2回目以降：420mg/body	30分		
	ハーセプチン	初回：8mg/kg	1時間30分	day1	
		2回目以降：6mg/kg	30分		
CAPOX	カペシタビン	2000mg/m ² /日		day1夕-15朝	21日
	エルブラット	130mg/m ²		2時間	
CAPOX+BEV	アバスチン	5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	21日
	カペシタビン	2000mg/m ² /日		day1夕-15朝	
	エルブラット	130mg/m ²		2時間	
SOX	エスワンタイホウ	80-120mg/日		day1夕-15朝	21日
	エルブラット	130mg/m ²		2時間	
SOX+BEV	アバスチン	7.5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	21日
	エスワンタイホウ	80-120mg/日		day1夕-15朝	
	エルブラット	130mg/m ²		2時間	
FTD/TPI+BEV	ロンサーフ	70mg/m ² /日		day1夕-6朝, 8夕-13朝	28日
	アバスチン	5mg/kg		1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	
CAP+BEV	カペシタビン	2000mg/m ² /日		day1夕-15朝	21日
	アバスチン	7.5mg/kg		1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	
S-1+BEV	エスワンタイホウ	80-120mg/m ²		day1夕-15朝	21日
	アバスチン	7.5mg/kg		1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	
UFT/LV+BEV	ユーエフティ	300mg/m ² /日		day1夕-22昼	28日
	ホリナート	75mg/日		day1夕-22昼	
	アバスチン	5mg/kg		1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	
5-FU/I-LV (RPMI regimen)	レボホリナート	250mg/m ²	2時間	day1	7日
	5-FU (急速静注)	500mg/m ²	全開	day1	

レジメン名	抗がん剤（商品名）	投与量	投与時間	投与日	1コースの日数
sLV5FU2	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	14日
	5-FU（急速静注）	400mg/m ²	全開	day1	
	5-FU（持続静注）	2400mg/m ²	46時間	day1-3	
sLV5FU2 +BEV	アバスタチン	5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	
	5-FU（急速静注）	400mg/m ²	全開	day1	
	5-FU（持続静注）	2400mg/m ²	46時間	day1-3	
ENCO +CET(400/250)	アービタックス	初回：400mg/m ²	2時間	day1, 8	14日
		2回目以降：250mg/m ²	1時間		
	ピラフトビ	300mg/日		連日	
IRI+BEV	カンプト	150mg/m ²	1時間	day1	14日
	アバスタチン	10mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	
IRI+PANI	カンプト	150mg/m ²	1時間	day1	14日
	ベクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	
IRI +CET(400/250)	カンプト	150mg/m ²	1時間	day1	14日
	アービタックス	初回：400mg/m ²	2時間	day1, 8	
		2回目以降：250mg/m ²	1時間		
IRI +CET(500)	カンプト	150mg/m ²	1時間	day1	14日
	アービタックス	500mg/m ²	2時間 (2回目以降は1時間)	day1	
IRIS	エスワンタイホウ	80-120mg/日		day1夕-15朝	28日
	カンプト	125mg/m ²	1時間	day1, 15	
IRIS+BEV	エスワンタイホウ	80-120mg/日		day1夕-15朝	28日
	カンプト	100mg/m ²	1時間	day1, 15	
	アバスタチン	5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1, 15	
IRIS+PANI	エスワンタイホウ	80-120mg/日		day1夕-15朝	28日
	カンプト	100mg/m ²	1時間	day1, 15	
	ベクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	
SIRB	エスワンタイホウ	80-120mg/日		day1夕-15朝	21日
	カンプト	150mg/m ²	1時間	day1	
	アバスタチン	7.5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	
CAPIRI	カペシタビン	2000mg/m ² /日		day1夕-15朝	21日
	カンプト	200mg/m ²	1時間	day1	
CAPIRI+BEV	カペシタビン	2000mg/m ² /日		day1夕-15朝	21日
	カンプト	200mg/m ²	1時間	day1	
	アバスタチン	7.5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	

レジメン名	抗がん剤（商品名）	投与量	投与時間	投与日	1コースの日数
mFOLFOX6	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	14日
	エルブラット	85mg/m ²	2時間	day1	
	5-FU（急速静注）	400mg/m ²	全開	day1	
	5-FU（持続静注）	2400mg/m ²	46時間	day1-3	
mFOLFOX6+BEV	アバスタチン	5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	
	エルブラット	85mg/m ²	2時間	day1	
	5-FU（急速静注）	400mg/m ²	全開	day1	
	5-FU（持続静注）	2400mg/m ²	46時間	day1-3	
mFOLFOX6 +CET(400/250)	アーピタックス	初回：400mg/m ²	2時間	day1, 8	14日
		2回目以降：250mg/m ²	1時間		
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	
	エルブラット	85mg/m ²	2時間	day1	
	5-FU（急速静注）	400mg/m ²	全開	day1	
	5-FU（持続静注）	2400mg/m ²	46時間	day1-3	
mFOLFOX6 +CET(500)	アーピタックス	500mg/m ²	2時間（2回目以降は1時間）	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	
	エルブラット	85mg/m ²	2時間	day1	
	5-FU（急速静注）	400mg/m ²	全開	day1	
	5-FU（持続静注）	2400mg/m ²	46時間	day1-3	
mFOLFOX6 +PANI	ペクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	
	エルブラット	85mg/m ²	2時間	day1	
	5-FU（急速静注）	400mg/m ²	全開	day1	
	5-FU（持続静注）	2400mg/m ²	46時間	day1-3	
FOLFIRI	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	14日
	カンプト	150mg/m ²	1時間30分	day1	
	5-FU（急速静注）	400mg/m ²	全開	day1	
	5-FU（持続静注）	2400mg/m ²	46時間	day1-3	
FOLFIRI+BEV	アバスタチン	5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	
	カンプト	150mg/m ²	1時間30分	day1	
	5-FU（急速静注）	400mg/m ²	全開	day1	
	5-FU（持続静注）	2400mg/m ²	46時間	day1-3	

レジメン名	抗がん剤（商品名）	投与量	投与時間	投与日	1コースの日数
FOLFIRI+RAM	サイラムザ	8mg/kg	1時間（2回目以降は30分）	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	
	カンプト	150mg/m ²	1時間30分	day1	
	5-FU（急速静注）	400mg/m ²	全開	day1	
	5-FU（持続静注）	2400mg/m ²	46時間	day1-3	
FOLFIRI+AFL	ザルトラップ	4mg/kg	1時間	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	
	カンプト	150mg/m ²	1時間30分	day1	
	5-FU（急速静注）	400mg/m ²	全開	day1	
	5-FU（持続静注）	2400mg/m ²	46時間	day1-3	
FOLFIRI +CET(400/250)	アービタックス	初回：400mg/m ²	2時間	day1, 8	14日
		2回目以降：250mg/m ²	1時間		
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	
	カンプト	150mg/m ²	1時間30分	day1	
	5-FU（急速静注）	400mg/m ²	全開	day1	
	5-FU（持続静注）	2400mg/m ²	46時間	day1-3	
FOLFIRI +CET(500)	アービタックス	500mg/m ²	2時間（2回目以降は1時間）	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	
	カンプト	150mg/m ²	1時間30分	day1	
	5-FU（急速静注）	400mg/m ²	全開	day1	
	5-FU（持続静注）	2400mg/m ²	46時間	day1-3	
FOLFIRI+PANI	ベクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	
	カンプト	150mg/m ²	1時間30分	day1	
	5-FU（急速静注）	400mg/m ²	全開	day1	
	5-FU（持続静注）	2400mg/m ²	46時間	day1-3	
FOLFOXIRI	カンプト	165mg/m ²	1時間	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	
	エルブラット	85mg/m ²	2時間	day1	
	5-FU（持続静注）	3200mg/m ²	46時間	day1-3	
FOLFOXIRI+BEV	アバチン	5mg/kg	1時間30分 （2回目は1時間、3回目以降は30分）	day1	14日
	カンプト	165mg/m ²	1時間	day1	
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	
	エルブラット	85mg/m ²	2時間	day1	
	5-FU（持続静注）	3200mg/m ²	46時間	day1-3	