

| レジメン名                    | 抗がん剤（商品名）      | 投与量              | 投与時間                      | 投与日              | 1コースの日数 |
|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------|
| CET(500)                 | アービタックス        | 500mg/㎡          | 2時間（2回目は1時間30分、3回目以降は1時間） | day1             | 14日     |
| PANI                     | ペクティビックス       | 6mg/kg           | 1時間                       | day1             | 14日     |
| IRI                      | イリノテカン         | 100mg/㎡          | 1時間                       | day1, 8, 15      | 28日     |
| Nivo(240)                | オプジーボ          | 240mg/body       | 30分                       | day1             | 14日     |
| Nivo(480)                | オプジーボ          | 480mg/body       | 30分                       | day1             | 28日     |
| Ipi+Nivo                 | ヤーボイ           | 1mg/kg           | 30分                       | day1             | 21日     |
|                          | オプジーボ          | 240mg/body       | 30分                       | day1             |         |
| PER+TRA                  | パージェタ          | 初回：840mg/body    | 1時間                       | day1             | 21日     |
|                          |                | 2回目以降：420mg/body | 30分                       |                  |         |
|                          | トラスツズマブBS      | 初回：8mg/kg        | 1時間30分                    | day1             |         |
|                          |                | 2回目以降：6mg/kg     | 30分                       |                  |         |
| CAPOX                    | カペシタビン         | 2000mg/㎡/日       |                           | day1夕-15朝        | 21日     |
|                          | オキサリプラチン       | 130mg/㎡          | 2時間                       | day1             |         |
| CAPOX+BEV [BS]           | ペバシズマブBS       | 5mg/kg           | 1時間30分（2回目は1時間、3回目以降は30分） | day1             | 21日     |
|                          | カペシタビン         | 2000mg/㎡/日       |                           | day1夕-15朝        |         |
|                          | オキサリプラチン       | 130mg/㎡          | 2時間                       | day1             |         |
| SOX                      | エスワンタイホウ       | 80-120mg/日       |                           | day1夕-15朝        | 21日     |
|                          | オキサリプラチン       | 130mg/㎡          | 2時間                       | day1             |         |
| SOX+BEV [BS]             | ペバシズマブBS       | 7.5mg/kg         | 1時間30分（2回目は1時間、3回目以降は30分） | day1             | 21日     |
|                          | エスワンタイホウ       | 80-120mg/日       |                           | day1夕-15朝        |         |
|                          | オキサリプラチン       | 130mg/㎡          | 2時間                       | day1             |         |
| FTD/TPI+BEV [BS]         | ロンサーフ          | 70mg/㎡/日         |                           | day1夕-6朝, 8夕-13朝 | 28日     |
|                          | ペバシズマブBS       | 5mg/kg           | 1時間30分（2回目は1時間、3回目以降は30分） | day1, 15         |         |
| CAP+BEV [BS]             | カペシタビン         | 2000mg/㎡/日       |                           | day1夕-15朝        | 21日     |
|                          | ペバシズマブBS       | 7.5mg/kg         | 1時間30分（2回目は1時間、3回目以降は30分） | day1             |         |
| S-1+BEV [BS]             | エスワンタイホウ       | 80-120mg/㎡       |                           | day1夕-15朝        | 21日     |
|                          | ペバシズマブBS       | 7.5mg/kg         | 1時間30分（2回目は1時間、3回目以降は30分） | day1             |         |
| UFT/LV+BEV [BS]          | ユーエフティ         | 300mg/㎡/日        |                           | day1夕-22昼        | 28日     |
|                          | ホリナート          | 75mg/日           |                           | day1夕-22昼        |         |
|                          | ペバシズマブBS       | 5mg/kg           | 1時間30分（2回目は1時間、3回目以降は30分） | day1, 15         |         |
| 5-FU/I-LV (RPMI regimen) | レボホリナート        | 250mg/㎡          | 2時間                       | day1             | 7日      |
|                          | フルオロウラシル（急速静注） | 500mg/㎡          | 全開                        | day1             |         |
| sLV5FU2                  | レボホリナート        | 200mg/㎡          | 2時間                       | day1             | 14日     |
|                          | フルオロウラシル（急速静注） | 400mg/㎡          | 全開                        | day1             |         |
|                          | フルオロウラシル（持続静注） | 2400mg/㎡         | 46時間                      | day1-3           |         |
| sLV5FU2+BEV [BS]         | ペバシズマブBS       | 5mg/kg           | 1時間30分（2回目は1時間、3回目以降は30分） | day1             | 14日     |
|                          | レボホリナート        | 200mg/㎡          | 2時間                       | day1             |         |
|                          | フルオロウラシル（急速静注） | 400mg/㎡          | 全開                        | day1             |         |
|                          | フルオロウラシル（持続静注） | 2400mg/㎡         | 46時間                      | day1-3           |         |
| ENCO+CET(500)            | アービタックス        | 500mg/㎡          | 2時間（2回目は1時間30分、3回目以降は1時間） | day1             | 14日     |
|                          | ピラフトビ          | 300mg/日          |                           | 連日               |         |
| IRI+BEV [BS]             | イリノテカン         | 150mg/㎡          | 1時間                       | day1             | 14日     |
|                          | ペバシズマブBS       | 10mg/kg          | 1時間30分（2回目は1時間、3回目以降は30分） | day1             |         |
| IRI+PANI                 | イリノテカン         | 150mg/㎡          | 1時間                       | day1             | 14日     |
|                          | ペクティビックス       | 6mg/kg           | 1時間                       | day1             |         |
| IRI+CET(500)             | イリノテカン         | 150mg/㎡          | 1時間                       | day1             | 14日     |
|                          | アービタックス        | 500mg/㎡          | 2時間（2回目は1時間30分、3回目以降は1時間） | day1             |         |
| IRIS                     | エスワンタイホウ       | 80-120mg/日       |                           | day1夕-15朝        | 28日     |
|                          | イリノテカン         | 125mg/㎡          | 1時間                       | day1, 15         |         |
| Soto+PANI                | ルマケラス          | 960mg/日          |                           | 連日               | 28日     |
|                          | ペクティビックス       | 6mg/kg           | 1時間                       | day1, 15         |         |
| IRIS+BEV [BS]            | エスワンタイホウ       | 80-120mg/日       |                           | day1夕-15朝        | 28日     |
|                          | イリノテカン         | 100mg/㎡          | 1時間                       | day1, 15         |         |
|                          | ペバシズマブBS       | 5mg/kg           | 1時間30分（2回目は1時間、3回目以降は30分） | day1, 15         |         |
| SIRB [BS]                | エスワンタイホウ       | 80-120mg/日       |                           | day1夕-15朝        | 21日     |
|                          | イリノテカン         | 150mg/㎡          | 1時間                       | day1             |         |
|                          | ペバシズマブBS       | 7.5mg/kg         | 1時間30分（2回目は1時間、3回目以降は30分） | day1             |         |
| CAPIRI                   | カペシタビン         | 2000mg/㎡/日       |                           | day1夕-15朝        | 21日     |
|                          | イリノテカン         | 200mg/㎡          | 1時間                       | day1             |         |
| CAPIRI+BEV [BS]          | カペシタビン         | 2000mg/㎡/日       |                           | day1夕-15朝        | 21日     |
|                          | イリノテカン         | 200mg/㎡          | 1時間                       | day1             |         |
|                          | ペバシズマブBS       | 7.5mg/kg         | 1時間30分（2回目は1時間、3回目以降は30分） | day1             |         |
| ENCO+BINI+CET(500)       | アービタックス        | 500mg/㎡          | 2時間（2回目は1時間30分、3回目以降は1時間） | day1             | 14日     |
|                          | ピラフトビ          | 300mg/日          |                           | 連日               |         |
|                          | メクトビ           | 90mg/日           |                           | 連日               |         |
| mFOLFOX6                 | レボホリナート        | 200mg/㎡          | 2時間                       | day1             | 14日     |
|                          | オキサリプラチン       | 85mg/㎡           | 2時間                       | day1             |         |
|                          | フルオロウラシル（急速静注） | 400mg/㎡          | 全開                        | day1             |         |
|                          | フルオロウラシル（持続静注） | 2400mg/㎡         | 46時間                      | day1-3           |         |
| mFOLFOX6+BEV [BS]        | ペバシズマブBS       | 5mg/kg           | 1時間30分（2回目は1時間、3回目以降は30分） | day1             | 14日     |
|                          | レボホリナート        | 200mg/㎡          | 2時間                       | day1             |         |
|                          | オキサリプラチン       | 85mg/㎡           | 2時間                       | day1             |         |
|                          | フルオロウラシル（急速静注） | 400mg/㎡          | 全開                        | day1             |         |
|                          | フルオロウラシル（持続静注） | 2400mg/㎡         | 46時間                      | day1-3           |         |
| mFOLFOX6+CET(500)        | アービタックス        | 500mg/㎡          | 2時間（2回目は1時間30分、3回目以降は1時間） | day1             | 14日     |
|                          | レボホリナート        | 200mg/㎡          | 2時間                       | day1             |         |
|                          | オキサリプラチン       | 85mg/㎡           | 2時間                       | day1             |         |
|                          | フルオロウラシル（急速静注） | 400mg/㎡          | 全開                        | day1             |         |
|                          | フルオロウラシル（持続静注） | 2400mg/㎡         | 46時間                      | day1-3           |         |

|                     |                 |                       |                            |        |     |
|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|--------|-----|
| mFOLFOX6+PANI       | ベクティビックス        | 6mg/kg                | 1時間                        | day1   | 14日 |
|                     | レボホリナート         | 200mg/m <sup>2</sup>  | 2時間                        | day1   |     |
|                     | オキサリプラチン        | 85mg/m <sup>2</sup>   | 2時間                        | day1   |     |
|                     | フルオロウラシル (急速静注) | 400mg/m <sup>2</sup>  | 全開                         | day1   |     |
|                     | フルオロウラシル (持続静注) | 2400mg/m <sup>2</sup> | 46時間                       | day1-3 |     |
| FOLFIRI             | レボホリナート         | 200mg/m <sup>2</sup>  | 2時間                        | day1   | 14日 |
|                     | イリノテカン          | 150mg/m <sup>2</sup>  | 1時間30分                     | day1   |     |
|                     | フルオロウラシル (急速静注) | 400mg/m <sup>2</sup>  | 全開                         | day1   |     |
|                     | フルオロウラシル (持続静注) | 2400mg/m <sup>2</sup> | 46時間                       | day1-3 |     |
| FOLFIRI+BEV [BS]    | ペバシズマブBS        | 5mg/kg                | 1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分) | day1   | 14日 |
|                     | レボホリナート         | 200mg/m <sup>2</sup>  | 2時間                        | day1   |     |
|                     | イリノテカン          | 150mg/m <sup>2</sup>  | 1時間30分                     | day1   |     |
|                     | フルオロウラシル (急速静注) | 400mg/m <sup>2</sup>  | 全開                         | day1   |     |
|                     | フルオロウラシル (持続静注) | 2400mg/m <sup>2</sup> | 46時間                       | day1-3 |     |
| FOLFIRI+RAM         | サイラムザ           | 8mg/kg                | 1時間 (2回目以降は30分)            | day1   | 14日 |
|                     | レボホリナート         | 200mg/m <sup>2</sup>  | 2時間                        | day1   |     |
|                     | イリノテカン          | 150mg/m <sup>2</sup>  | 1時間30分                     | day1   |     |
|                     | フルオロウラシル (急速静注) | 400mg/m <sup>2</sup>  | 全開                         | day1   |     |
|                     | フルオロウラシル (持続静注) | 2400mg/m <sup>2</sup> | 46時間                       | day1-3 |     |
| FOLFIRI+AFL         | ザルトラップ          | 4mg/kg                | 1時間                        | day1   | 14日 |
|                     | レボホリナート         | 200mg/m <sup>2</sup>  | 2時間                        | day1   |     |
|                     | イリノテカン          | 150mg/m <sup>2</sup>  | 1時間30分                     | day1   |     |
|                     | フルオロウラシル (急速静注) | 400mg/m <sup>2</sup>  | 全開                         | day1   |     |
|                     | フルオロウラシル (持続静注) | 2400mg/m <sup>2</sup> | 46時間                       | day1-3 |     |
| FOLFIRI+CET(500)    | アービタックス         | 500mg/m <sup>2</sup>  | 2時間 (2回目は1時間30分、3回目以降は1時間) | day1   | 14日 |
|                     | レボホリナート         | 200mg/m <sup>2</sup>  | 2時間                        | day1   |     |
|                     | イリノテカン          | 150mg/m <sup>2</sup>  | 1時間30分                     | day1   |     |
|                     | フルオロウラシル (急速静注) | 400mg/m <sup>2</sup>  | 全開                         | day1   |     |
|                     | フルオロウラシル (持続静注) | 2400mg/m <sup>2</sup> | 46時間                       | day1-3 |     |
| FOLFIRI+PANI        | ベクティビックス        | 6mg/kg                | 1時間                        | day1   | 14日 |
|                     | レボホリナート         | 200mg/m <sup>2</sup>  | 2時間                        | day1   |     |
|                     | イリノテカン          | 150mg/m <sup>2</sup>  | 1時間30分                     | day1   |     |
|                     | フルオロウラシル (急速静注) | 400mg/m <sup>2</sup>  | 全開                         | day1   |     |
|                     | フルオロウラシル (持続静注) | 2400mg/m <sup>2</sup> | 46時間                       | day1-3 |     |
| FOLFOXIRI+BEV [BS]  | ペバシズマブBS        | 5mg/kg                | 1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分) | day1   | 14日 |
|                     | イリノテカン          | 165mg/m <sup>2</sup>  | 1時間                        | day1   |     |
|                     | レボホリナート         | 200mg/m <sup>2</sup>  | 2時間                        | day1   |     |
|                     | オキサリプラチン        | 85mg/m <sup>2</sup>   | 2時間                        | day1   |     |
|                     | フルオロウラシル (持続静注) | 3200mg/m <sup>2</sup> | 46時間                       | day1-3 |     |
| mFOLFOXIRI+BEV [BS] | ペバシズマブBS        | 5mg/kg                | 1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分) | day1   | 14日 |
|                     | イリノテカン          | 150mg/m <sup>2</sup>  | 1時間                        | day1   |     |
|                     | レボホリナート         | 200mg/m <sup>2</sup>  | 2時間                        | day1   |     |
|                     | オキサリプラチン        | 85mg/m <sup>2</sup>   | 2時間                        | day1   |     |
|                     | フルオロウラシル (持続静注) | 2400mg/m <sup>2</sup> | 46時間                       | day1-3 |     |